โรคพิษสุนัขบ้าหรือเรียกว่าโรคกลัวน้ำ

สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ชื่อว่าเรปี่ส์ไวรัส (Rabies Virus) ทำให้เกิดโรคได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น คน สุนัข แมว ลิง กระรอก ค้างคาว ฯลฯ โรคนี้เมื่อเป็นแล้วจะทำให้มีอาการทางประสาท โดยเฉพาะระบบประสาทส่วนกลาง และถ้าเป็นแล้วเสียชีวิตทุกราย ในปัจจุบันยังไม่มียาอะไรที่จะรักษาโรคพิษสุนัขบ้าได้

การติดต่อในสุนัขและแมว เชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าจะเข้าสู่ร่างกายสัตว์ทางบาดแผลที่ถูกสุนัขและแมวที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดโดยตรง หรือน้ำลายสัตว์ไปสัมผัสบริเวณบาดแผลที่ฉีดขาดที่ผิวหนังหรือตามเยื่อเมือกต่างๆ ของร่างกาย เช่น เยื่อเมือกบริเวณตา จมูก เป็นต้น

อาการโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว แบ่งออกเป็น 3 ระยะ

<u>อาการเริ่มแรก</u> จะสังเกตเห็นอุปนิสัยและอารมณ์เปลี่ยนไปจากเดิม ในระยะนี้อุณหภูมิร่างกายอาจสูงขึ้นผิดปกติเล็กน้อย ม่านตาจะขยายโตกว่าปกติและเริ่มมีการตอบสนองต่อแสงลดลง สุนัขจะแสดงอาการระยะนี้ประมาณ 2 - 3 วัน ก่อนจะเข้าสู่ระยะตื่นเต้น

<u>อาการระยะตื่นเต้น</u> มีอาการกระวนกระวาย มีอาการทางประสาท ดุร้าย น้ำลายไหล แสดงอาการสิ่งแปลกปลอมติดลำคอ เกิดอัมพาตของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับการเคี้ยวและการกลืน โดยสุนัขจะแสดงอาการระยะนี้ประมาณ 1 – 7 วัน ก่อนเข้าสู่ระยะอัมพาต

<u>อาการระยะอัมพาต</u> ระยะนี้จะสั้นมาก จะมีอาการขาอ่อนเปลี้ยโดยเฉพาะขาหลัง สุนัขจะล้มลงแล้วลุกไม่ได้ เกิดเป็นอัมพาตขึ้นทั้งตัวอย่างรวดเร็วแล้วตาย

การป้องกัน นำสุนัขและแมวไปรับวัคซีนพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่อายุ 2 เดือนขึ้นไป ตามคำแนะนำของสัตวแพทย์

**** หากพบสัตว์แสดงอาการหรือสงสัยสัตว์ป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ ****

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก